



Évaluation de la prise en charge des patients aux antécédents coronariens connus, présentant un nouvel infarctus du myocarde, en termes de recours au Centre 15, de prise en charge et de mortalité.

G.Ranchon¹, P.Serre², O.Capel³, T.Perret⁴, N. Eydoux⁵, M.Bischoff⁵, C.El Khoury⁶


Congrès Urgences 2012 - Session Cardio Insuffisance coronarienne 1 - CP 203 - jeudi 31 mai 2012 à 16h30

INTRODUCTION

Les patients coronariens doivent être informés des modalités de prise en charge d'éventuelles récurrences angineuses. Ils doivent être d'emblée considérés à plus haut risque par les médecins les prenant en charge. Nous avons cherché à savoir si ces messages étaient bien perçus par les malades et les médecins.

METHODE

Nous avons analysé les caractéristiques, les délais de recours et de prise en charge, les stratégies et le devenir des patients aux antécédents personnels d'accident coronaire, comparés aux patients « naïfs », dans une population de 1357 patients pris en charge pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST.



RESULTATS

Les patients aux antécédents coronariens représentent 13% de notre population.

	ATCD	Naïfs
Age	68 ans	65 ans
Appel au 15	67%	54%
Délai douleur/1 ^{er} contact médical	120min	145min
Thrombolyse	8.5%	11%
Clopidogrel	66%	76%
Aspirine	89%	94%
Coronarographie	96%	98%
Angioplastie	65%	77%

Délai 1^{er} contact médical / gonflement du ballonnet strictement identique

Mortalité hospitalière et à 30 jours similaire dans les deux groupes, respectivement de 7% et de 12%.

CONCLUSION

- 1) Délai de recours réduits pour les patients aux antécédents coronariens personnels qui semblent plus sensibilisés à l'appel au 15 devant la survenue d'une douleur thoracique.
- 2) Prise en charge conforme aux recommandations.
- 3) Deux tiers des patients ont un geste de revascularisation, dans un tiers des cas la coronarographie n'aboutit pas à un geste de revascularisation. Il est donc important de continuer à bien informer ces patients à risque de la nécessité d'appel au Centre 15 et de prise de nitrés devant toute nouvelle douleur thoracique.

¹ CH de Mâcon (71), ²CH de Bourg en Bresse (01), ³ SAMU 69, ⁴ CH St Luc St Joseph, Lyon (69)

⁵ RESCUE RESUVal – Vienne (38), ⁶ CH de Vienne (38)